

**EGZAMIN MATURALNY  
OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015**

**MATEMATYKA  
POZIOM ROZSZERZONY**

**ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA  
(A1, A2, A3, A4, A6, A7)**

**GRUDZIEŃ 2014**

## Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych

Nr zadania	1	2	3	4	5
Odpowiedź	A	C	D	C	B

<b>Wymagania ogólne</b>	<b>Wymagania szczegółowe</b>
-------------------------	------------------------------

### Zadanie 1. (0–1)

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.	R3.4. Zdający stosuje twierdzenia o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian $x - a$ .
--	--

**Poprawna odpowiedź: A**

### Zadanie 2. (0–1)

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.	R8.5., 4.5. Zdający posługuje się równaniem okręgu $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ oraz opisuje koła za pomocą nierówności, rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru.
--	--

**Poprawna odpowiedź: C**

### Zadanie 3. (0–1)

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	R11.4. Zdający korzysta z własności pochodnej do wyznaczenia przedziałów monotoniczności funkcji.
--	---

**Poprawna odpowiedź: D**

### Zadanie 4. (0–1)

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	R6.4. Zdający posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych (np. przy rozwiązywaniu nierówności typu $\sin x > a, \cos x \leq a, \operatorname{tg} x > a$ ).
--	---

**Poprawna odpowiedź: C**

### Zadanie 5. (0–1)

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	4.4., 4.3. Zdający na podstawie wykresu funkcji $y = f(x)$ szkicuje wykresy funkcji $y = f(x + a)$ , $y = f(x) + a$ , $y = -f(x)$ , $y = f(-x)$ ; odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały znak; punkty, w których funkcja przyjmuje w podanym przedziale wartość największą lub najmniejszą).
--	---

**Poprawna odpowiedź: B**

**Zadanie 6. (0–2) – zadanie kodowane**

IV. Użycie i tworzenie strategii	G6.6., 2.1. Zdający wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias, używa wzorów skróconego mnożenia na $(a \pm b)^2$ oraz $a^2 - b^2$ .
----------------------------------	--


**Poprawna odpowiedź: 210****Zadanie 7. (0–2)**

Długości boków prostokąta są równe 3 oraz 5. Oblicz sinus kąta ostrego, który tworzą przekątne tego prostokąta.

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji	6.1., R6.5. Zdający wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o miarach od $0^\circ$ do $180^\circ$ , stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów.
---	--

**Rozwiązanie (I sposób):**

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku.



Wtedy  $\alpha = 2\beta$ . Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy  $AC = \sqrt{34}$ .

Ponieważ  $\sin \beta = \frac{3}{\sqrt{34}}$  oraz  $\cos \beta = \frac{5}{\sqrt{34}}$ , więc

$$\sin \alpha = 2 \sin \beta \cos \beta = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{34}} \cdot \frac{5}{\sqrt{34}} = \frac{15}{17}$$

**Rozwiązanie (II sposób):**

Przekątna tego prostokąta ma długość  $\sqrt{34}$ . Niech  $\alpha$  oznacza kąt ostry między przekątnymi tego prostokąta.

Obliczamy pole  $P$  prostokąta dwoma sposobami:

$$P = 3 \cdot 5 = 15, \quad P = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{34}}{2} \cdot \frac{\sqrt{34}}{2} \cdot \sin \alpha = 17 \sin \alpha.$$

Stąd  $\sin \alpha = \frac{15}{17}$ .

### Schemat oceniania

#### Zdający otrzymuje – 1 pkt

jeżeli:

$$\text{poda wartość } \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{\sqrt{34}} \text{ i } \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{5}{\sqrt{34}}$$

albo

poda sposób obliczenia pola prostokąta przy wykorzystaniu  $\sin \alpha$ .

#### Zdający otrzymuje – 2 pkt

jeżeli obliczy  $\sin \alpha = \frac{15}{17}$ .

#### Zadanie 8. (0–2)

Oblicz granicę  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2}{n+2} - \frac{(n+2)^2}{n+444} \right)$ .

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji	R11.1. Zdający oblicza granice funkcji (i granice jednostronne), korzystając z twierdzeń o działaniach na granicach i z własności funkcji ciągłych.
---	---

**Rozwiązanie:**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2}{n+2} - \frac{(n+2)^2}{n+444} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2(n+444) - (n+2)^3}{(n+2)(n+444)} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{438n^2 - 12n - 8}{(n+2)(n+444)} = 438 \end{aligned}$$

### Schemat oceniania

#### Zdający otrzymuje – 1 pkt

jeżeli poprawnie zapisze wyrażenie  $\frac{n^2}{n+2} - \frac{(n+2)^2}{n+444}$  w postaci ułamka, np.  $\frac{438n^2 - 12n - 8}{(n+2)(n+444)}$ .

#### Zdający otrzymuje – 2 pkt

jeżeli poprawnie obliczy wartość granicy.

**Zadanie 9. (0–2)**

Funkcja  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = \frac{x^2}{x-4}$  dla każdej liczby rzeczywistej  $x \neq 4$ . Oblicz pochodną funkcji  $f$  w punkcie  $x=12$ .

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji	R11.2. Zdający oblicza pochodne funkcji wymiernych.
---	---

**Rozwiązanie:**

$$f'(x) = \frac{2x(x-4) - x^2}{(x-4)^2} = \frac{x^2 - 8x}{(x-4)^2},$$

$$f'(12) = \frac{144 - 96}{64} = \frac{3}{4}.$$

**Schemat oceniania****Zdający otrzymuje – 1 pkt**

gdy poprawnie poda wzór funkcji  $f'$ , np.  $f'(x) = \frac{2x(x-4) - x^2}{(x-4)^2}$

**Zdający otrzymuje – 2 pkt**

gdy obliczy wartość pochodnej dla  $x=12$ :  $f'(12) = \frac{3}{4}$

**Zadanie 10. (0–3)**

Funkcja  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = x^4$  dla każdej liczby rzeczywistej  $x$ . Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji  $f$ , która jest równoległa do prostej  $y = 4x + 7$ .

IV. Użycie i tworzenie strategii	R11.3. Zdający korzysta z geometrycznej i fizycznej interpretacji pochodnej.
----------------------------------	--

**Rozwiązanie:**

Styczna do wykresu funkcji  $f$  w punkcie  $(x_0, f(x_0))$  jest prostą o równaniu

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Obliczamy pochodną funkcji  $f$ :

$$f'(x) = 4x^3$$

Ponieważ styczna jest równoległa do prostej o równaniu  $y = 4x + 7$ , więc  $f'(x_0) = 4$ .

Zatem  $x_0 = 1$  i styczna ma równanie

$$y - 1 = 4(x - 1), \text{ czyli } y = 4x - 3.$$

### Schemat oceniania

#### Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.

Obliczenie pochodnej funkcji  $f$ :  $f'(x) = 4x^3$ .

#### Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.

Obliczenie pierwszej współrzędnej punktu styczności:  $x_0 = 1$ .

#### Rozwiązanie pełne – 3 p.

Zapisanie równania stycznej w postaci np.  $y = 4x - 3$ .

#### Zadanie 11. (0–3)

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste  $x$ , spełniające równanie  $\sin 5x - \sin x = 0$ .

IV. Użycie i tworzenie strategii	R6.5. Zdający stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów.
----------------------------------	--

#### Rozwiązanie (I sposób):

Korzystamy ze wzoru na różnicę sinusów i zapisujemy równanie w postaci

$$2 \sin 2x \cos 3x = 0$$

zatem

$$\sin 2x = 0 \text{ lub } \cos 3x = 0$$

stąd otrzymujemy kolejno:

$\sin 2x = 0$ , gdy  $2x = k\pi$  czyli  $x = \frac{k\pi}{2}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą,

$\cos 3x = 0$ , gdy  $3x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  czyli  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

#### Schemat oceniania I sposobu rozwiązania

#### Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.

Zapisanie równania w postaci iloczynowej np.  $\sin 2x \cos 3x = 0$

#### Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.

Zapisanie rozwiązań równania

- $\sin 2x = 0$ :  $x = \frac{k\pi}{2}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą

albo

- $\cos 3x = 0$ :  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

#### Rozwiązanie pełne – 3 p.

Zapisanie wszystkich rozwiązań równania  $\sin 5x - \sin x = 0$ :  $x = \frac{k\pi}{2}$  lub  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

**Rozwiązanie (II sposób):**

Zapisujemy równanie w postaci  $\sin 5x = \sin x$ .

Z własności funkcji sinus wynika, że

$$5x = x + 2k\pi, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą}$$

lub

$$5x = \pi - x + 2k\pi, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą,}$$

zatem

$$4x = 2k\pi, \text{ czyli } x = \frac{k\pi}{2}, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą}$$

lub

$$6x = \pi + 2k\pi, \text{ czyli } x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą.}$$

**Schemat oceniania II sposobu rozwiązania****Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.**

Zapisanie jednej z zależności:  $5x = x + 2k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą lub

$$5x = \pi - x + 2k\pi, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą.}$$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.**

Zapisanie obu zależności:  $5x = x + 2k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą oraz  $5x = \pi - x + 2k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

**Rozwiązanie pełne – 3 p.**

Zapisanie wszystkich rozwiązań równania  $\sin 5x - \sin x = 0$ :  $x = \frac{k\pi}{2}$  lub  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

**Uwagi**

1. Jeżeli zdający zapisze jedynie  $5x = x$ , to otrzymuje 0 punktów.
2. Jeżeli zdający zapisze  $5x = x$  oraz  $5x = \pi - x$ , to otrzymuje 1 punkt.
3. Jeżeli zdający zapisze tylko jedną z zależności  $5x = x + 2k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą lub  $5x = \pi - x + 2k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą i w rezultacie uzyska tylko jedną serię rozwiązań:  $x = \frac{k\pi}{2}$  albo  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą, to otrzymuje 2 punkty.

**Zadanie 12. (0–3)**

Niech  $P_n$  oznacza pole koła o promieniu  $\frac{1}{2^n}$ , dla  $n \geq 1$ . Oblicz sumę wszystkich wyrazów ciągu  $(P_n)$ .

IV. Użycie i tworzenie strategii	R5.3. Zdający rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy.
----------------------------------	---

**Rozwiązanie:**

Pole koła o promieniu  $r_n = \frac{1}{2^n}$  jest równe  $\pi \cdot \left(\frac{1}{2^n}\right)^2 = \frac{\pi}{4^n}$ , czyli  $P_n = \frac{\pi}{4^n}$ . Dla  $n \geq 1$  zachodzi równość  $\frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{1}{4}$ . Wynika stąd, że  $(P_n)$  jest ciągiem geometrycznym o ilorazie  $q = \frac{1}{4}$  i pierwszym wyrazie  $P_1 = \frac{\pi}{4}$ . Ponieważ  $-1 < \frac{1}{4} < 1$ , więc suma  $S$  wszystkich wyrazów ciągu  $(P_n)$  jest skończona i jest równa

$$S = \frac{P_1}{1-q} = \frac{\frac{\pi}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\pi}{3}$$

**Schemat oceniania**

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 1 p.**

Obliczenie pierwszego wyrazu i ilorazu ciągu  $(P_n)$ :  $P_1 = \frac{\pi}{4}$ ,  $q = \frac{1}{4}$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 2 p.**

Stwierdzenie, że istnieje skończona suma wszystkich wyrazów ciągu  $(P_n)$ , np.:  $|q| = \frac{1}{4} < 1$

**Rozwiązanie pełne ..... 3 p.**

Obliczenie sumy  $S$  wszystkich wyrazów ciągu  $(P_n)$ :  $S = \frac{\pi}{3}$

**Uwaga:**

Jeżeli zdający obliczy sumę wszystkich wyrazów ciągu  $(P_n)$ , ale nie stwierdzi, że  $|q| < 1$ , to otrzymuje 2 punkty.

**Zadanie 13. (0–3)**

Wykaż, że jeżeli  $a > b \geq 1$ , to  $\frac{a}{2+a^3} < \frac{b}{2+b^3}$ .

V. Rozumowanie i argumentacja	R2.6. Zdający dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; rozszerza i (w łatwych przypadkach) skraca wyrażenia wymierne.
----------------------------------	---

**Rozwiązanie (I sposób):**

Przekształcamy nierówność  $\frac{a}{2+a^3} < \frac{b}{2+b^3}$  równoważnie.

$$2a + ab^3 < 2b + a^3b,$$

$$2(a-b) < ab(a^2 - b^2),$$

$$2(a-b) < ab(a-b)(a+b).$$

Ponieważ  $a > b$ , więc możemy obie strony tej nierówności podzielić przez  $a-b > 0$ .

Otrzymujemy

$$2 < ab(a+b).$$

Ponieważ  $a > b \geq 1$ , to  $ab > 1$  oraz  $a+b > 2$ , zatem  $ab(a+b) > 1 \cdot 2 = 2$ . To kończy dowód.

**Schemat oceniania I sposobu rozwiązania****Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.**

Zapisanie nierówności  $\frac{a}{2+a^3} < \frac{b}{2+b^3}$  w postaci  $2(a-b) < ab(a^2 - b^2)$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.**

Stwierdzenie, że dla  $a > b \geq 1$  nierówność  $\frac{a}{2+a^3} < \frac{b}{2+b^3}$  jest równoważna nierówności

$$2 < ab(a+b)$$

**Uwaga:**

Zdający zamiast podzielić obie strony nierówności przez  $a-b > 0$ , może zapisać nierówność w postaci równoważnej  $(a-b)(ab(a+b)-2) > 0$

**Rozwiązanie pełne – 3 p.**

Przeprowadzenie pełnego dowodu.

**Rozwiązanie (II sposób):**

Definiujemy funkcję  $f$  określoną wzorem  $f(x) = \frac{x}{2+x^3}$  dla każdej liczby rzeczywistej

$$x \neq -\sqrt[3]{2}.$$

Obliczamy pochodną funkcji  $f$ :  $f'(x) = \frac{2(1-x^3)}{(2+x^3)^2}$

Stwierdzamy, że  $f'(x) < 0$  dla  $x \in (1, +\infty)$ . Wynika stąd, że w przedziale  $(1, +\infty)$  funkcja  $f$  jest malejąca. Zatem dla dowolnych dwóch argumentów  $a > b$  z tego przedziału prawdziwa jest nierówność  $f(a) < f(b)$ , czyli  $\frac{a}{2+a^3} < \frac{b}{2+b^3}$ , co należało udowodnić.

### Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

#### Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.

Określenie funkcji  $f(x) = \frac{x}{2+x^3}$  i obliczenie jej pochodnej  $f'(x) = \frac{2(1-x^3)}{(2+x^3)^2}$

#### Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.

Określenie znaku pochodnej funkcji  $f$  w przedziale  $(1, +\infty)$ :  $f'(x) < 0$  dla  $x \in (1, +\infty)$

#### Rozwiązanie pełne – 3 p.

Stwierdzenie, że w przedziale  $(1, +\infty)$  funkcja  $f$  jest malejąca i wywnioskowanie prawdziwości tezy.

#### Zadanie 14. (0–4)

Wykaż, że jeżeli  $\alpha, \beta, \gamma$  są kątami wewnętrznymi trójkąta i  $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2 \gamma$ , to  $\cos \gamma < 0$ .

V. Rozumowanie i argumentacja	R7.5. Zdający znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów.
-------------------------------	---

#### Rozwiązanie (I sposób):

Niech  $a, b, c$  oznaczają długości boków trójkąta leżących naprzeciwko kątów, odpowiednio,  $\alpha, \beta, \gamma$ , i niech  $R$  będzie promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Z twierdzenia sinusów otrzymujemy

$$\sin \alpha = \frac{a}{2R}, \quad \sin \beta = \frac{b}{2R}, \quad \sin \gamma = \frac{c}{2R}.$$

Zatem nierówność  $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2 \gamma$  możemy zapisać w postaci

$$\left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 < \left(\frac{c}{2R}\right)^2.$$

Stąd  $a^2 + b^2 < c^2$ , czyli  $a^2 + b^2 - c^2 < 0$ . Zatem z twierdzenia cosinusów otrzymujemy

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} < 0.$$

**Uwaga:**

Zamiast wykorzystać twierdzenie sinusów możemy również skorzystać ze wzoru na pole trójkąta i wówczas otrzymujemy

$$\sin \alpha = \frac{2P}{bc}, \quad \sin \beta = \frac{2P}{ac}, \quad \sin \gamma = \frac{2P}{ab}$$

Dalsza część rozwiązania przebiega tak samo.

**Schemat oceniania:**

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania – 1 p.**

Zastosowanie

- twierdzenia sinusów, np. zapisanie równości:  $\sin \alpha = \frac{a}{2R}$ ,  $\sin \beta = \frac{b}{2R}$ ,  $\sin \gamma = \frac{c}{2R}$

albo

- wzoru na pole trójkąta i zapisanie równości:  $\sin \alpha = \frac{2P}{bc}$ ,  $\sin \beta = \frac{2P}{ac}$ ,  $\sin \gamma = \frac{2P}{ab}$

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 2 p.**

Zapisanie nierówności  $a^2 + b^2 - c^2 < 0$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 3 p.**

Zastosowanie twierdzenia cosinusów do zapisania równości  $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ .

**Rozwiązanie pełne – 4 p.**

Poprawne uzasadnienie, że  $\cos \gamma < 0$ .

**Uwaga:**

Jeżeli zdający zauważy, że z nierówności  $a^2 + b^2 < c^2$  wynika, że trójkąt jest rozwartokątny oraz  $\gamma$  jest kątem rozwartym, a stąd  $\cos \gamma < 0$ , to otrzymuje **4 punkty**.

**Rozwiązanie (II sposób):**

Ponieważ  $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$ , więc  $\sin \gamma = \sin(180^\circ - (\alpha + \beta)) = \sin(\alpha + \beta)$ . Nierówność

$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2 \gamma$  możemy zapisać w postaci

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2(\alpha + \beta).$$

Ze wzoru na sinus sumy kątów otrzymujemy

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta)^2$$

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2 \alpha \cos^2 \beta + 2 \sin \alpha \cos \beta \cos \alpha \sin \beta + \cos^2 \alpha \sin^2 \beta$$

$$\sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \beta - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta < 2 \sin \alpha \cos \beta \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin^2 \alpha (1 - \cos^2 \beta) + \sin^2 \beta (1 - \cos^2 \alpha) < 2 \sin \alpha \cos \beta \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin^2 \alpha \sin^2 \beta + \sin^2 \beta \sin^2 \alpha < 2 \sin \alpha \cos \beta \cos \alpha \sin \beta$$

$$2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta < 2 \sin \alpha \cos \beta \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin^2 \alpha \sin^2 \beta < \sin \alpha \cos \beta \cos \alpha \sin \beta$$

Obie strony nierówności możemy podzielić przez  $\sin \alpha \sin \beta > 0$ , otrzymując

$$\sin \alpha \sin \beta < \cos \alpha \cos \beta$$

$$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta > 0$$

$$\cos(\alpha + \beta) > 0$$

Stąd wynika, że  $\alpha + \beta < 90^\circ$ , więc  $\gamma > 90^\circ$ . To oznacza, że  $\cos \gamma < 0$ , co kończy dowód.

### **Schemat oceniania II sposobu rozwiązania**

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania – 1 p.**

Doprowadzenie nierówności do postaci  $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2(\alpha + \beta)$

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 2 p.**

Doprowadzenie nierówności do postaci

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2 \alpha \cos^2 \beta + 2 \sin \alpha \cos \beta \cos \alpha \sin \beta + \cos^2 \alpha \sin^2 \beta$$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 3 p.**

Doprowadzenie nierówności do postaci  $\cos(\alpha + \beta) > 0$

**Rozwiązanie pełne – 4 p.**

Poprawne uzasadnienie, że  $\cos \gamma < 0$ .


**Zadanie 15. (0–4)**

Punkt  $E$  jest środkiem boku  $BC$  prostokąta  $ABCD$ , w którym  $AB > BC$ . Punkt  $F$  leży na boku  $CD$  tego prostokąta oraz  $\sphericalangle AEF = 90^\circ$ . Udowodnij, że  $\sphericalangle BAE = \sphericalangle EAF$ .

V. Rozumowanie i argumentacja	G10.14. Zdający stosuje cechy przystawania trójkątów.
-------------------------------	---

**Rozwiązanie (I sposób):**

Przedłużamy odcinki  $AB$  i  $EF$  do przecięcia w punkcie  $G$ .



Trójkąty  $ECF$  i  $EBG$  są przystające (oba są prostokątne, kąty  $CEF$  i  $BEG$  są równe, gdyż są wierzchołkowe oraz  $CE = BE$ ), skąd  $EF = EG$ . Zatem trójkąty  $AEF$  i  $AEG$  są przystające (oba są prostokątne,  $AE$  jest ich wspólną przyprostokątną i przyprostokątne  $EF$  i  $EG$  mają tę samą długość). Zatem  $\sphericalangle EAF = \sphericalangle EAB$ , co kończy dowód.

**Schemat oceniania I sposobu rozwiązania**

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.**

Zapisanie, że trójkąty  $ECF$  i  $EBG$  są przystające.

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.**


Zapisanie, że trójkąty  $AEF$  i  $AEG$  są przystające.

**Rozwiązanie pełne – 3 p.**

Zapisanie, że  $\sphericalangle EAF = \sphericalangle EAB$ .

**Rozwiązanie (II sposób):**

Przedłużamy odcinki  $AE$  i  $DC$  do przecięcia w punkcie  $G$ .



Trójkąty  $ABE$  i  $GCE$  są przystające (oba są prostokątne, kąty  $CEG$  i  $BEA$  są równe, gdyż są wierzchołkowe oraz  $CE = BE$ ), skąd  $AE = GE$  oraz  $\sphericalangle EGC = \sphericalangle EAB$ . Prosta  $EF$  jest więc

symetralną odcinka  $AG$ . Zatem  $AF = FG$ . Trójkąt  $AGF$  jest więc równoramienny, czyli  $\sphericalangle EAF = \sphericalangle EGF = \sphericalangle EAB$ . To kończy dowód.

### Schemat oceniania II sposobu rozwiązania

#### Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.

Zapisanie, że trójkąty  $ABE$  i  $GCE$  są przystające.

#### Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.


Zapisanie, że  $\sphericalangle EGF = \sphericalangle EAB$ .

#### Rozwiązanie pełne – 3 p.

Zapisanie, że  $\sphericalangle EAF = \sphericalangle EAB$ .

#### Rozwiązanie (III sposób):

Przyjmijmy oznaczenia, jak na rysunku.



Trójkąt  $ABE$  jest prostokątny, więc  $\sphericalangle AEB = 90^\circ - \alpha$ , kąt  $AEF$  jest prosty, więc  $\sphericalangle CEF = 180^\circ - (90^\circ - \alpha) - 90^\circ = \alpha$ . Zatem trójkąty  $ABE$  i  $ECF$  są podobne, skąd

$$\frac{FC}{EC} = \frac{BE}{AB}, \text{ czyli } \frac{a-x}{b} = \frac{b}{a}.$$

Stąd  $x = \frac{a^2 - b^2}{a}$ .

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkątów  $ABE$  i  $ADF$  otrzymujemy

$$AE = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ oraz } AF = \sqrt{x^2 + (2b)^2}$$

zatem

$$\begin{aligned} AF &= \sqrt{x^2 + 4b^2} = \sqrt{\left(\frac{a^2 - b^2}{a}\right)^2 + 4b^2} = \sqrt{\frac{(a^2 - b^2)^2 + 4a^2b^2}{a^2}} = \\ &= \sqrt{\frac{a^4 + 2a^2b^2 + b^4}{a^2}} = \sqrt{\frac{(a^2 + b^2)^2}{a^2}} = \frac{a^2 + b^2}{a} \end{aligned}$$

stąd otrzymujemy

$$\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ oraz } \cos \beta = \frac{AG}{AF} = \frac{x}{AF} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

Następnie  $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \frac{a^2}{a^2 + b^2} - 1 = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} = \cos \beta$ , czyli  $2\alpha = \beta$ , co należało udowodnić.

**Schemat oceniania III sposobu rozwiązania:**

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 1 p.**

Zapisanie, że  $\cos \beta = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 2 p.**


Zapisanie, że  $\cos \beta = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$  oraz  $\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

**Rozwiązanie pełne ..... 3 p.**

Zapisanie, że  $\cos \beta = \cos 2\alpha$ .

**Rozwiązanie (IV sposób):**

Przyjmijmy oznaczenia, jak na rysunku.



Trójkąt  $ABE$  jest prostokątny, więc  $\sphericalangle AEB = 90^\circ - \alpha$ , kąt  $AEF$  jest prosty, więc  $\sphericalangle CEF = 180^\circ - (90^\circ - \alpha) - 90^\circ = \alpha$ . Zatem trójkąty  $ABE$  i  $ECF$  są podobne, skąd

$$\frac{FC}{EC} = \frac{BE}{AB}, \text{ czyli } \frac{a-x}{b} = \frac{b}{a}$$

Stąd  $x = \frac{a^2 - b^2}{a}$

Z trójkątów  $ABE$  i  $AGF$  otrzymujemy

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a} \text{ oraz } \operatorname{tg} \beta = \frac{2b}{x} = \frac{2b}{\frac{a^2 - b^2}{a}} = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$$

Zauważmy, że  $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2 \cdot \frac{b}{a}}{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \frac{\frac{2b}{a}}{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = \frac{2ab}{a^2 - b^2} = \operatorname{tg} \beta$ , czyli  $2\alpha = \beta$

To należało udowodnić.

### Schemat oceniania IV sposobu rozwiązania

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp – 1 p.

Zapisanie, że  $\operatorname{tg}\beta = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$

Pokonanie zasadniczych trudności zadania – 2 p.

Zapisanie, że  $\operatorname{tg}\beta = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$  oraz  $\operatorname{tg}\alpha = \frac{b}{a}$

Rozwiązanie pełne – 3 p.

Zapisanie, że  $\operatorname{tg}\beta = \operatorname{tg}2\alpha$

### Zadanie 16. (0–5)

Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe, że w trzykrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry otrzymamy co najmniej jedną „jedynekę”, pod warunkiem, że otrzymamy co najmniej jedną „szóstkę”.

III. Modelowanie matematyczne	R10.2. Zdający oblicza prawdopodobieństwo warunkowe.
-------------------------------	--

### Rozwiązanie:

Zdarzeniami elementarnymi są wszystkie trzywyrazowe ciągi o wyrazach ze zbioru  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  (czyli trójelementowe wariacje z powtórzeniami tego zbioru). Jest to model klasyczny.  $|\Omega| = 6^3 = 216$ .

Wprowadźmy oznaczenia dla zdarzeń

$A$  – otrzymamy co najmniej raz jedno oczko,

$B$  – otrzymamy co najmniej raz sześć oczek.

Mamy obliczyć prawdopodobieństwo warunkowe  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$ .

Moc zdarzenia  $B$  obliczymy, korzystając z pojęcia zdarzenia przeciwnego, które polega na tym, że nie otrzymamy ani razu sześciu oczek.

$$|B| = |\Omega| - |B'| = 6^3 - 5^3 = 216 - 125 = 91.$$

Zdarzenie  $A \cap B$  jest sumą parami rozłącznych zdarzeń:

- otrzymamy raz jedno oczko, raz sześć oczek i raz liczbę oczek ze zbioru  $\{2, 3, 4, 5\}$  – możliwe są  $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$  takie wyniki,
- otrzymamy raz jedno oczko i dwa razy sześć oczek; możliwe są 3 takie wyniki,
- otrzymamy dwa razy jedno oczko i raz sześć oczek; możliwe są 3 takie wyniki.

Stąd  $|A \cap B| = 30$  i  $P(A|B) = \frac{30}{91}$

### Uwaga:

$|A \cap B|$  można obliczyć korzystając z prawa de Morgana.

$$|A \cap B| = \left| \left( (A \cap B)' \right)' \right| = |\Omega| - |A' \cup B'| = |\Omega| - (|A'| + |B'| - |A' \cap B'|) =$$

$$= 6^3 - (5^3 + 5^3 - 4^3) = 30$$

### Schemat oceniania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania zadania..... 1 p.**

Zapisanie wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe przy poprawnie wprowadzonych oznaczeniach.

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.**

Obliczenie  $|B| = 91$  lub  $P(B)$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.**

Obliczenie  $|A \cap B| = 30$  lub  $P(A \cap B)$ .

**Rozwiązanie prawie pełne ..... 4 p.**

Rozwiązanie zadania do końca z błędami rachunkowymi.

**Rozwiązanie pełne ..... 5 p.**

Obliczenie  $P(A|B) = \frac{30}{91}$ .

### Zadanie 17. (0–6)

Dany jest okrąg  $o_0$  o równaniu  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$ . W pierwszej „ćwiartce” układu współrzędnych istnieją dwa okręgi  $o_1, o_2$  styczne zewnętrznie do okręgu  $o_0$  i jednocześnie styczne do obu osi układu współrzędnych. Oblicz odległość środków okręgów  $o_1$  oraz  $o_2$ .

IV. Użycie i tworzenie strategii	R8.5. Zdający posługuje się równaniem okręgu $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ oraz opisuje koła za pomocą nierówności.
----------------------------------	---

### Rozwiązanie:

Okrąg o równaniu  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$  ma środek w punkcie  $(3,1)$  i promień 1. Z treści zadania wynika, że okręgi  $o_1, o_2$  leżą w pierwszej „ćwiartce” układu współrzędnych.

Równanie okręgu leżącego w I „ćwiartce” układu współrzędnych i stycznego do obu osi układu jest postaci

$$(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2, \text{ gdzie } r > 0.$$

Zapisujemy warunek styczności okręgów. Okręgi są styczne zewnętrznie, czyli odległość środków tych okręgów jest równa sumie ich promieni, zatem

$$\sqrt{(r-3)^2 + (r-1)^2} = r+1.$$

Przekształcając to równanie, otrzymujemy równanie  $r^2 - 10r + 9 = 0$ , które ma dwa rozwiązania  $r_1 = 1, r_2 = 9$ .

Środki  $S_1, S_2$  okręgów  $\alpha_1, \alpha_2$  mają współrzędne  $S_1 = (1, 1), S_2 = (9, 9)$  i ich odległość jest równa  $8\sqrt{2}$ .

**Schemat oceniania:**

**Rozwiązanie, w którym postępowanie jest niewielkie, ale konieczne na drodze do pełnego rozwiązania zadania ..... 1 p.**

Zapisanie, że okrąg o równaniu  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$  ma środek w punkcie  $(3, 1)$  i promień 1.

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.**

Zapisanie postaci równania okręgu leżącego w I „kwadracie” układu współrzędnych i stycznego do obu osi układu jest postaci  $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$ , gdzie  $r > 0$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.**

Zapisanie równania wynikającego z warunku styczności okręgów

$$\sqrt{(r-3)^2 + (r-1)^2} = r+1$$

**Rozwiązanie prawie pełne ..... 5 p.**

**Rozwiązanie pełne ..... 6 p.**

Obliczenie odległości środków okręgów:  $8\sqrt{2}$ .


**Zadanie 18. (0–7)**

Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, którego krótsza podstawa i ramiona mają długość po 4 dm. Oblicz, jaką długość powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, aby do pomieszczenia wpadało przez to okno jak najwięcej światła, czyli aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole.

V. Rozumowanie i argumentacja	R11.6. Zdający stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.
-------------------------------	---

**Rozwiązanie (I sposób):**

Niech  $x$  oznacza długość rzutu prostokątnego ramienia trapezu na prostą zawierającą dłuższą podstawę trapezu, a  $h$  – wysokość trapezu.



Z geometrycznych warunków zadania wynika, że  $0 < x < 4$ .

Przy tak przyjętych oznaczeniach pole trapezu jest określone wzorem:

$$P = \frac{2 \cdot 4 + 2x}{2} \cdot h = (4 + x) \cdot h \quad \text{dla } 0 < x < 4$$

Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy

$$x^2 + h^2 = 4^2,$$

stąd  $h = \sqrt{16 - x^2}$ .

Pole trapezu, w zależności od zmiennej  $x$ , jest określone wzorem:

$$\begin{aligned} P(x) &= (4+x)\sqrt{16-x^2} = \sqrt{(4+x)^2(16-x^2)} = \\ &= \sqrt{(4+x)^3(4-x)} = \sqrt{-x^4 - 8x^3 + 128x + 256} \end{aligned}$$

gdzie  $0 < x < 4$ .

Należy obliczyć, dla jakiego  $x$  spełniającego nierówność  $0 < x < 4$ , funkcja  $P$  określona wzorem  $P(x) = \sqrt{-x^4 - 8x^3 + 128x + 256}$  przyjmuje wartość największą.

Funkcja  $P$  osiąga wartość największą, gdy funkcja  $f(x) = -x^4 - 8x^3 + 128x + 256$  osiąga w przedziale  $(0, 4)$  wartość największą. Wystarczy więc zbadać funkcję  $f$ . Wyznamy pochodną tej funkcji

$$f'(x) = -4x^3 - 24x^2 + 128$$

Następnie obliczamy miejsca zerowe pochodnej:  $x_1 = x_2 = -4$ ,  $x_3 = 2$

Ponadto:

- $f'(x) > 0$  w przedziale  $(0, 2)$ ,
- $f'(x) < 0$  w przedziale  $(2, 4)$

Zatem funkcja  $f$  jest rosnąca w przedziale  $(0, 2)$  i malejąca w przedziale  $(2, 4)$ .

Ponieważ  $P(x) = \sqrt{f(x)}$  dla  $x \in (0, 4)$ , więc funkcja  $P$  jest rosnąca w przedziale  $(0, 2)$ , a malejąca w przedziale  $(2, 4)$ . Stąd wynika, że w punkcie  $x = 2$  funkcja  $P$  przyjmuje wartość największą.

Gdy  $x = 2$ , to  $2x + 4 = 8$ , czyli dłuższa podstawa trapezu ma długość 8, a pole tego trapezu jest wówczas równe

$$P(2) = (4+2) \cdot \sqrt{16-2^2} = 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}.$$

Odpowiedź: Największe pole, równe  $12\sqrt{3}$  dm<sup>2</sup>, ma szyba w kształcie trapezu, którego dłuższa podstawa ma długość 8 dm.

### Schemat oceniania I sposobu rozwiązania:

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów.

**Pierwszy etap** składa się z trzech części:

- wybór zmiennej  $x$  (długość rzutu prostokątnego ramienia trapezu na prostą zawierającą dłuższą podstawę trapezu) i zapisanie za pomocą tej zmiennej wysokości trapezu:  $h = \sqrt{16 - x^2}$
- zapisanie pola trapezu w zależności od zmiennej  $x$ :  $P(x) = (4+x)\sqrt{16-x^2}$
- określenie dziedziny funkcji  $P$ :  $(0, 4)$

Zdający może otrzymać maksymalnie po **1 punkcie** za realizację każdej z części tego etapu, przy czym dziedzina funkcji nie może wynikać jedynie z wyznaczonego wzoru funkcji, ale z geometrycznych warunków zadania.

**Drugi etap** składa się z trzech części:

a) wyznaczenie pochodnej funkcji wielomianowej  $f(x) = -x^4 - 8x^3 + 128x + 256$ :

$$f'(x) = -4x^3 - 24x^2 + 128,$$

b) obliczenie miejsc zerowych pochodnej:  $x_1 = x_2 = -4$ ,  $x_3 = 2$ ,

c) uzasadnienie (np. przez badanie monotoniczności funkcji), że funkcja  $P$  osiąga wartość największą w punkcie  $x = 2$ .

Za poprawne rozwiązanie każdej z części tego etapu zdający otrzymuje 1 punkt, o ile poprzednia część etapu została zrealizowana bezbłędnie.

**Trzeci etap.**

Obliczenie pola trapezu dla  $x = 2$ :  $P(2) = 12\sqrt{3}$ .


Za poprawne rozwiązanie tego etapu zdający otrzymuje 1 punkt.

**Uwaga:**

Punkt za trzeci etap przyznajemy tylko w przypadku, gdy zdający wyznaczył poprawnie  $x = 2$ .

**Rozwiązanie (II sposób):**

Niech  $x$  oznacza długość dłuższej podstawy trapezu, a  $h$  – wysokość trapezu.



Długość  $y$  rzutu prostokątnego ramienia trapezu na prostą zawierającą dłuższą podstawę trapezu jest wówczas równa  $y = \frac{x-4}{2}$ .

Z geometrycznych warunków zadania wynika, że  $4 < x < 12$ .

Przy tak przyjętych oznaczeniach pole trapezu jest określone wzorem:

$$P = \frac{x+4}{2} \cdot h \quad \text{i} \quad 4 < x < 12$$

Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy

$$y^2 + h^2 = 4^2,$$
$$\left(\frac{x-4}{2}\right)^2 + h^2 = 4^2.$$

$$\text{stąd } h = \sqrt{16 - \left(\frac{x-4}{2}\right)^2} = \sqrt{16 - \frac{x^2 - 8x + 16}{4}} = \sqrt{\frac{64 - x^2 + 8x - 16}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{-x^2 + 8x + 48}$$

Pole trapezu, w zależności od zmiennej  $x$ , jest określone wzorem:

$$P(x) = \frac{x+4}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{-x^2 + 8x + 48} = \frac{1}{4} \sqrt{(x+4)^2 (-x^2 + 8x + 48)} =$$
$$= \frac{1}{4} \sqrt{(x^2 + 8x + 16)(-x^2 + 8x + 48)} = \frac{1}{4} \sqrt{-x^4 + 96x^2 + 512x + 768}$$

gdzie  $4 < x < 12$ .

Należy obliczyć, dla jakiego  $x$  spełniającego nierówność  $4 < x < 12$ , funkcja  $P$  określona wzorem  $P(x) = \frac{1}{4}\sqrt{-x^4 + 96x^2 + 512x + 768}$  przyjmuje wartość największą.

Funkcja  $P$  osiąga wartość największą, gdy funkcja  $f(x) = -x^4 + 96x^2 + 512x + 768$  osiąga w przedziale  $(4, 12)$  wartość największą. Wystarczy więc zbadać funkcję  $f$ . Wyznamy pochodną tej funkcji

$$f'(x) = -4x^3 + 192x + 512$$

Następnie obliczamy miejsca zerowe pochodnej:  $x_1 = x_2 = -4$ ,  $x_3 = 8$ .

Ponadto:

- $f'(x) > 0$  w przedziale  $(4, 8)$
- $f'(x) < 0$  w przedziale  $(8, 12)$

Zatem funkcja  $f$  jest rosnąca w przedziale  $(4, 8)$  i malejąca w przedziale  $(8, 12)$ .

Ponieważ  $P(x) = \frac{1}{4}\sqrt{f(x)}$  dla  $x \in (4, 12)$ , więc funkcja  $P$  jest rosnąca w przedziale  $(4, 8)$ , a malejąca w przedziale  $(8, 12)$ . Stąd wynika, że w punkcie  $x = 8$  funkcja  $P$  przyjmuje wartość największą.

Dla  $x = 8$  pole tego trapezu jest równe

$$P(8) = \frac{4+8}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{-8^2 + 8 \cdot 8 + 48} = 3\sqrt{48} = 12\sqrt{3}$$

Odpowiedź.: Największe pole, równe  $12\sqrt{3}$  dm<sup>2</sup>, ma szyba w kształcie trapezu, którego dłuższa podstawa ma długość 8 dm.

### Schemat oceniania II sposobu rozwiązania:

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów.

**Pierwszy etap** składa się z trzech części:

- wybór zmiennej  $x$  (długość dłuższej podstawy trapezu) i zapisanie za pomocą tej zmiennej wysokości trapezu:  $h = \sqrt{16 - \left(\frac{x-4}{2}\right)^2}$
- zapisanie pola trapezu w zależności od zmiennej  $x$ :  $P(x) = \frac{x+4}{4} \cdot \sqrt{-x^2 + 8x + 48}$
- określenie dziedziny funkcji  $P$ :  $(4, 12)$ .

Zdający może otrzymać maksymalnie po 1 punkcie za realizację każdej z części tego etapu, przy czym dziedziną funkcji nie może wynikać jedynie z wyznaczonego wzoru funkcji, ale z geometrycznych warunków zadania.

**Drugi etap** składa się z trzech części:

- wyznaczenie pochodnej funkcji wielomianowej  $f(x) = -x^4 + 96x^2 + 512x + 768$ :  
 $f'(x) = -4x^3 + 192x + 512$ ,
- obliczenie miejsc zerowych pochodnej:  $x_1 = x_2 = -4$ ,  $x_3 = 8$ ,
- uzasadnienie (np. przez badanie monotoniczności funkcji), że funkcja  $P$  osiąga wartość największą w punkcie  $x = 8$ .

Za poprawne rozwiązanie każdej z części tego etapu zdający otrzymuje 1 punkt, o ile poprzednia część etapu została zrealizowana bezbłędnie.

Trzeci etap.

Obliczenie pola trapezu dla  $x = 8$ :  $P(8) = 12\sqrt{3}$ .

Za poprawne rozwiązanie tego etapu zdający otrzymuje 1 punkt.

**Uwaga:**

Punkt za trzeci etap przyznajemy tylko w przypadku, gdy zdający wyznaczył poprawnie  $x = 8$ .